

**Контроль вхідного рівня знань слухачів
циклу ТУ "Актуальні питання неонатології в клінічній практиці
педіатра та лікаря загальної практики – сімейної медицини"**

1. З якого гестаційного віку (тижні) визначається життєздатність плода
 - А. 25-28
 - Б. 22-24
 - В. 28-30
 - Г. 32-34

2. До групи ризику порушення адаптації належать діти
 - А. Народжені до 37 тижня гестації
 - Б. Народжені на 38-40 тижні гестації від фізіологічних пологів
 - В. Від матерів з прееклампсією
 - Г. Народжені шляхом кесарського розтину
 - Д. З масою тіла до 1000г
 - Е. З масою тіла більше 4000г

3. Коли проводити перетискання та пересікання пуповини у активної дитини
 - А. Відразу після народження
 - Б. Через 15 хвилин після народження
 - В. Час не має значення
 - Г. Після закінчення пульсації пуповини, або через 1 хвилину після народження
 - Д. Через 30 хвилин після народження

4. Тривалість контакту "шкіра до шкіри" здорового новонародженого з матір'ю повинна тривати
 - А. 30 хвилин
 - Б. 2 години
 - В. 15-20 хвилин
 - Г. 1 годину
 - Д. Час не має значення

5. Температура в пологовому залі під час народження дитини повинна становити
 - А. 20°
 - Б. 22°
 - В. Не менше 25°
 - Г. Не більше 28°
 - Д. 20-23°

6. Коли проводять зважування і антропометрію здорового новонародженого

- А.Одразу після народження
- Б.Через 30 хвилин після народження дитини
- В.Наприкінці другої години життя перед переводом у відділення спільного перебування
- Г.Після першого купання
- Д.Через 12 годин після народження
- Е.У відділенні сумісного перебування

7. Пуповину, після накладання клеми, слід

- А.Обробити антисептиком, накласти суху стерильну пов'язку
- Б.Залишити сухою без додаткової обробки
- В.Обробити 90% спиртом, потім діамантовим зеленим або розчином перманганату калію

8. Пуповинний залишок в нормі повинен відшаруватись на

- А.3 добу
- Б.5-15 добу
- В.1 добу
- Г.18 добу

9. До правильних ознак прикладання дитини до грудей відноситься

- А.Мати відчуває, як дитина активно смокче
- Б.Рот дитини широко відкритий,
- В.Підборіддя торкається груді
- Г.Нижня губа дитини вивернута назовні
- Д.Дитина більше захоплює нижню частину ареоли

10. До групи дітей з малою масою тіла при народженні можна віднести

- А.Тільки передчасно народжених дітей
- Б.Тільки передчасно народжених дітей з внутрішньоутробною гіпотрофією
- В.Усіх новонароджених, незалежно від терміну гестації, з масою тіла при народженні менше 2500г
- Г.Доношених новонароджених з внутрішньоутробною гіпотрофією
- Д.Усіх новонароджених зі ЗВУР

11. Час згасання більшості вроджених рефлексів у доношених новонароджених (місяці)

- А.1-2
- Б.2-3
- В.3-6
- Г.7-8
- Д.8-9

12. Оцінка за шкалою Баллард містить

- А.Оцінку нервово-м'язової зрілості

- Б.Оцінку фізіологічних рефлексів
- В.Антропометричні дані
- Г.Оцінку морфо-фізіологічної зрілості
- Д.Оцінку дихання та серцевих скорочень"

13. Один найбільш інформативний метод для діагностики внутрішньошлуночкових крововиливів

- А.Електроенцефалографія
- Б.Пункція шлуночків
- В.Нейросонографія
- Г.Люмбальна пункція

14. Вкажіть імуноглобуліни, що проходять крізь плаценту і забезпечують активність гуморального імунітету

- А.Імуноглобулін G
- Б.Імуноглобулін M
- В.Імуноглобулін A
- Г.Імуноглобулін M та імуноглобулін A

15. Визначення співвідношення лецитин/сфінгомієлін в амніотичній рідині проводиться з метою

- А.Діагностики вроджених вад розвитку
- Б.Оцінки зрілості серцево-судинної системи
- В.Оцінки зрілості легенів плоду
- Г.Діагностики багатоплідної вагітності

16. Нормальна сатурація киснем гемоглобіну артеріальної крові у доношених новонароджених

- 85-89%
- 90-95%
- 98-100%

17. Для кровообігу плода характерні

- Функціонування овального вікна з шунтуванням справа-наліво
- Функціонування артеріальної протоки
- Легенева артеріальна вазоконстрикція
- Товщина правого та лівого шлуночків однакова
- Товщина лівого шлуночка більше

18. Вкажіть легеневий вазодилататор

- А.Пентоксифілін
- Б.О₂
- В.Індометацин
- Г.Кисень

- 19.Протеїнурією у новонароджених старше 1 тижня життя вважають кількість білку в сечі (г/л)
- А.Більше 0,33
 - Б.Більше 0,66
 - В.Більше 1,0
- 20.В якій з наступних ситуацій жовтяниця у доношеного новонародженого є фізіологічною
- А.Жовтяниця в перші 12 годин життя
 - Б.Жовтяниця виникла на 4 добу життя
 - В.Пряма фракція білірубіну більше 30% від загального
 - Г.Жовтяниця, яка виникла на 14 добу життя
- 21.На 6-й день життя дитина перестала рухати рукою, в загальному аналізі крові - лейкоцитоз. Найбільш вірогідно це обумовлено
- А.Паралічем Ерба
 - Б.Остеомієлітом плечової кістки
 - В.Переломом плеча
 - Г.Вивихом плеча
- 22.У дитини віком 3-х тижнів повторна блювота без домішки жовчі, з'явилися закрепи В проекції 12-палої кишки пальпується оливкоподібне утворення Ваш діагноз
- А.Новоутворення в області 12-палої кишки
 - Б.Вроджена непрохідність 12-палої кишки
 - В.Кіста
 - Г.Пілоростеноз
 - Д.Пілороспазм
 - Е.Халазія стравоходу
- 23.Доношена новонароджена дитина в пологовій кімнаті активна, голосно кричить, шкіра рожева, але в стані спокою спостерігаються значні втягнення міжреберних проміжків, ціаноз. Найбільш вірогідний діагноз
- А.Наркозна депресія
 - Б.Атрезія хоан
 - В.Діафрагмальна грижа
 - Г.Гіпоплазія легень
 - Д.Вроджена вада серця
- 24.Перші вдихи новонародженого супроводжуються
- А.Зменшенням резистентності легеневих судин, закриттям овального вікна, звуженням артеріальної протоки

- Б.Збільшенням резистентності легеневих судин, відкриттям овального вікна, звуженням артеріальної протоки
- В.Зменшенням резистентності легеневих судин, відкриттям овального вікна і артеріальної протоки

25.Які з наступних ознак оцінюються за шкалою Апгар

- А.Реакція зіниць на світло, пульс, дихання, тиск крові
- Б.Пульс, дихання, колір шкіри, рефлексорні реакції, м'язовий тонус
- В.Тиск крові, температура, пульс, дихання, рефлексорна реакція

26.Зціджування грудного молока необхідно для

- А.Полегшення стану при нагруданні молочної залози, розвитку лактостазу
- Б.Годуванні дитини із низькою вагою тіла, при порушенні її стану
- В.Взагалі ніколи не проводиться
- Г.Підтримки лактації при тимчасових протипоказаннях до грудного вигодовування
- Д.Стимуляції лактації при недостатній кількості молока

27.Для виключно грудного вигодовування протягом 6 місяців життя рекомендують

- А.Раннє прикладання до грудей матері
- Б.Постійне спільне перебування матері та дитини
- В.Долактаційне годування
- Г.Грудне годування за потребою дитини

28.Вкажіть оптимальний вид вигодовування дитини з гестаційним віком 34-35 тижнів протягом перших днів життя

- А.Годування з соски і пляшечки молочними сумішами
- Б.Годування з соски і пляшечки грудним молоком
- В.Зондове годування
- Г.Початкове годування з чашечки грудним молоком з наступним прикладанням до грудей матері і грудне вигодовування

29.Посилюють секрецію та виділення молока

- А.Гідрокортизон
- Б.Інсулін
- В.Оральні контрацептиви
- Г.Пролактин
- Д.Окситоцин

30.Які нехарчові функції виконують білки жіночого молока

- А.Імунна відповідь, синтез лактози, імунний захист
- Б.Покращують абсорбцію мінеральних речовин
- В.Стимулюють перистальтику
- Г.Прискорюють ріст певних корисних бактерій

Д.Знижують ріст бактерій

31.Грудне молоко містить білки, кальцій, фосфор, натрій, цинк, вітаміни у кількості, яка

А.Повністю задовольняє потреби недоношеної дитини

Б.Не задовольняє потреби передчасно народженої дитини

32.При грудному вигодовуванні ознаки правильного прикладання до грудей — це

А.Підборіддя дитини торкається до грудей

Б.Нижня губа дитини вивернута назовні

В.Рот дитини широко відкритий

Г.Дитина більш захоплює нижню частину ареоли

Д.Голова знаходиться вище тулуба для попередження аспірації

33.Нормальний вміст глюкози в крові новонароджених (ммоль/л)

А.2,6 - 5,9

Б.1,9 - 4,1

В.4,2 - 7,5

Г.1,0 - 8,0

34.Стан матері, який сприяє народженню дитини з великою масою

А.Цукровий діабет

Б.Вживання героїну

В.Прееклампсія

Г.Алкоголізм

35.Характерні для гіпоглікемії

А.Ціаноз

Б.Тремор, судоми

В.Гастроінтестинальні розлади

Г.Мозкова кома

36.Гіпотермія у новонародженого може зумовити

А.Апноє

Б.Гіпоксемію

В.Гіпоглікемію

Г.Алкалоз

Д.Ацидоз

37.Переваги годування грудним молоком передчасно народжених дітей порівняно з молочними сумішами наступні

А.Зниження захворювань на НЕК

Б.Краще засвоєння грудного молока

В.Профілактика кишкових інфекцій

Г.Більші темпи набору маси тіла

38.Для профілактики геморагічної хвороби новонароджених у передчасно народжених новонароджених слід застосовувати

- А.Етамзілат натрію
- Б.Свіжозаморожену плазму
- В.Діцинон
- Г.10% глюкозу
- Д.Препарати вітаміну К

39.У передчасно народженої дитини віком 1 місяця рівень гемоглобіну 80 г/л. Ступінь тяжкості анемії

- А.Легка
- Б.Середньо-тяжка
- В.Тяжка

40.Гемостаз включає такі фази (системи)

- А.Плазматичну
- Б.Судинну
- В.Тромбоцитарну
- Г.Активація кінінової системи

41.В разі залізодефіцитної анемії вагітної у плода має значення компенсаторний механізм

- А.Фетальний гемоглобін
- Б.Фетальний трансферин
- В.Збільшення кількості еритроцитів

42.Характерними для ранньої анемії передчасно народжених є дані

- А.Розвивається у 75 % передчасно народжених дітей з масою тіла 1500 г
- Б.Схильна до прогресу та стійкого перебігу
- В.Тяжкість анемії залежить від гестаційного віку, супутньої перинатальної патології
- Г.Потребує застосування еритропоетину
- Д.Не потребує медикаментозної корекції
- Е.Не впливає на адаптацію та розвиток передчасно народженої дитини

43.Передчасно народжена дитина, 33 - 34 тижні гестації з масою тіла 2000 г, у віці 1 місяць має Нв 80 г/л Ваш діагноз

- А.Норма для даного віку
- Б.Гостра постгеморагічна анемія
- В.Рання анемія передчасно народжених середнього ступеню
- Г.Пізня анемія передчасно народжених

44. Перерахуйте основні чинники ризику виникнення дефіцитної анемії у немовлят:

- А. Швидкі темпи росту
- Б. Залізодефіцитний раціон харчування
- В. Годування коров'ячим молоком
- Г. Внутрішньоутробна гіпоксія плода
- Д. Швидкий перетин пуповини

45. Лікувальна доза елементарного заліза у дитини з анемією середньої тяжкості становить (мг)

- А. 1-2
- Б. 3-5
- В. 8-10

46. Аналіз крові доношеної дитини 4-х днів: білірубін загальний - 184 мкмоль/л, прямий - 0, АЛТ - 0,23, АСТ - 0,18, гама-ГТ - 2,75 характеризує

- А. Вікову норму
- Б. Гемолітичну хворобу новонароджених
- В. Синдром згущення жовчі
- Г. Атрезію жовчних ходів

47. Характерні симптоми вродженої краснухи у новонароджених /тріада Грега /

- А. Гепатоспленомегалія, менінгіт, ентероколіт
- Б. Мікроцефалія, гальмування росту, сліпота
- В. Катаракта, глухота, вади серця
- Г. Міокардит, анемія, глухота

48. Гідроцефалія найбільш характерна для

- А. Цитомегаловірусної інфекції
- Б. Краснухи
- В. Токсоплазмозу

49. Дитина, народжена на 36-ому тижні, має масу тіла 2600г, зріст 47см.

Дану ситуацію Ви розціните як народження

- А. Передчасно народженої дитини з задовільним фізичним розвитком
- Б. Доношеної дитини, але малої до терміну
- В. Доношеної дитини з внутрішньоутробною гіпотрофією

50. Які з перерахованих причин сприяють швидкому охолодженню передчасно народженої дитини

- А. Незрілість центру терморегуляції
- Б. Малі запаси бурого жиру
- В. Знижені фізіологічні рефлекси
- Г. Гіпотонія м'язів
- Д. Мала поверхня тіла у порівнянні з вагою
- Е. Слабо розвинутий підшкірний жир